



DROGARIA DROGAVISTA LTDA

CNPJ: 00.956.548/0031-64

Av: Mar Vermelho, SN, Quadra 46, Lote 01
Intermares – Cabedelo/PB – Tel: (83) 3315-6513

TESTE RÁPIDO COVID-19

PESQUISA DE ANTIGENOS SARS-CoV-2

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

PACIENTE: D.NASC

ENDEREÇO:

TEL: CPF:

NOME DO RESPONSÁVEL E CONTATO (EM CASO DE MENOR DE IDADE OU INCAPACITADO):

IDENTIFICAÇÃO DO TESTE

NOME: CELLER WONDFO SARS COV 2

LOTE: W19610520

FABRICANTE: GUANGZHOU WONDFOBIOTECHCO LTDA

MS: 80537410083

IMPORTADO: CELER BIOTECNOLOGIA S/A

VALIDADE: 30/05/2022

MÉTODO: Colloidal Gold Immunochromatography

EQUIPAMENTO: cassete + Swab

IDENTIFICAÇÃO CLÍNICA

SINTOMAS APRESENTADOS:

FEBRE SIM NÃO

TOSSE SIM NÃO

PERDA DO OLFATO OU PALADAR SIM NÃO

DOR DE GARGANTA SIM NÃO

DIFICULDADE PARA RESPIRAR SIM NÃO

OUTROS SINTOMAS:

Tempo de sintomas:

COMO INTERPRETAR

O cartão é baseado no princípio da reação antígeno-anticorpo na técnica de imunoensaio. O cartão de testes contém proteína "N" do novo coronavírus marcada com outro coloidal, possui também anticorpo monoclonal da proteína "N" do Coronavírus correspondente na área de controle de qualidade ©. O teste rápido covid-19 possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha.

CONTATO FÍSICO COM INDIVÍDUOS

DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 SIM NÃO

COM SINTOMAS SUSPEITOS DE COVID-19 SIM NÃO

RESULTADO QUALITATIVO

Reagente Não Reagente

Valor de Referência: Amostra Não Reagente

Amostra: Swab nasofaringe

DATA E HORA DO ATENDIMENTO:

ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS:

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL

O resultado do teste não deve ser tomado como diagnóstico confirmatório. O resultado "Não reagente" não deve excluir a possibilidade de uma infecção e critério de interrupção de isolamento. Os resultados dos testes rápidos devem sempre ser considerados no contexto da clínica e dos dados epidemiológicos no estabelecimento do diagnóstico.